

Analyysi II

Jari Taskinen

19. huhtikuuta 2002

Luku 5

Sisältö

5 Väliarvolause	2
5.1 Implisiittifunktiolause	3

Sisältö:
Väliarvolause
Implisiitti-
funktiolause

Etusivu

◀ ▶

◀ ▶

Sivu *1 / 10*

Takaisin

Koko näyttö

Lopeta

5. Väliarvolause

Väliarvolause

Lause 5.1 Olkoon $A \subset \mathbf{R}^2$ ja $f : A \rightarrow \mathbf{R}$ differentioituva, ja olkoot $\bar{a}, \bar{b} \in A$ sellaisia pisteitä, että niiden yhdysjana sisältyy A :han. Tällöin on olemassa $\theta \in [0, 1]$, jolle

$$f(\bar{b}) - f(\bar{a}) = \nabla f(\bar{a} + \theta(\bar{b} - \bar{a})) \cdot (\bar{b} - \bar{a}). \quad (1)$$

Huomautus.

- 1) Lause 5.1 (sivu 2) pätee, kun \mathbf{R}^2 muutetaan \mathbf{R}^n :ksi.
- 2) Jos merkitään $\bar{b} - \bar{a} = \bar{h}$, niin (1) pätee jos ja vain jos

$$f(\bar{a} + \bar{h}) - f(\bar{a}) = \nabla f(\bar{a} + \theta\bar{h}) \cdot \bar{h}.$$

Lauseen 5.1 (sivu 2) todistus:

Todistus. Olkoon pisteiden \bar{a} ja \bar{b} yhdysjana

$$J = \{\bar{a} + t\bar{h} \mid 0 \leq t \leq 1\}.$$

Määritellään derivoituva funktio $g : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$,

$$g(t) = f(\bar{a} + t\bar{h}) \quad \left(= f(\bar{a} + t(\bar{b} - \bar{a})) \right).$$

Ketjusäännön mukaan

$$g'(t) = D_1 f(\bar{a} + t\bar{h})h_1 + D_2(\bar{a} + t\bar{h})h_2 = \nabla f(\bar{a} + t\bar{h}) \cdot \bar{h}.$$

Sisältö:
Väliarvolause
Implisiitti-
funktioilause

Etusivu

◀ ▶

◀ ▶

Sivu 2 / 10

Takaisin

Koko näyttö

Lopeta

Toisaalta väliarvolauseesta seuraa, että on olemassa $\theta \in]0, 1[$, jolle

$$g(1) - g(0) = g'(\theta)(1 - 0) = g'(\theta).$$

Saamme

$$f(\bar{a} + \bar{h}) - f(\bar{a}) = g(1) - g(0) = g'(\theta) = \nabla f(\bar{a} + \theta\bar{h}) \cdot \bar{h}.$$

□

Esimerkki Jos $|\nabla f(\bar{a})| \leq M$ tarkastelualueessa (ainakin janalla J), missä M on jokin positiivinen vakio, niin

$$\begin{aligned} |f(\bar{b}) - f(\bar{a})| &= |\nabla f(\bar{a} + \theta(\bar{b} - \bar{a})) \cdot (\bar{b} - \bar{a})| \\ &\leq |\nabla f(\bar{a} + \theta(\bar{b} - \bar{a}))| |\bar{b} - \bar{a}| \\ &\leq M |\bar{b} - \bar{a}|. \end{aligned}$$

Kaavaa voidaan soveltaa fysiikan virhearvioinneissa: \bar{b} on jokin mitattu suure, \bar{a} sen tarkka arvo, $|\bar{b} - \bar{a}|$ mittausvirhe (josta on jonkinlainen käsitys olemassa). Lauseke $f(\bar{a})$ on etsitty suure, ja edellä mainitun kaavan mukaan $M |\bar{b} - \bar{a}|$ on yläraja arvio virheelle, joka tehdään, kun $f(\bar{a})$:n likiarvo $f(\bar{b})$ lasketaan mittaustuloksen \bar{b} perusteella.

5.1. Implisiittifunktiolause

Implisiittifunktiolause

Sisältö:
Väliarvolause
Implisiitti-
funktiolause

Etusivu

◀▶

◀▶

Sivu 3 / 10

Takaisin

Koko näyttö

Lopeta

Lause 5.2 Olkoon $A \subset \mathbf{R}^2$ ja $f : A \rightarrow \mathbf{R}$ jatkuvasti derivoituva. Olkoon (a, b) piste, joka on f :n nollakohta, $f(a, b) = 0$. Oletetaan, että $D_2f(a, b) \neq 0$. Tällöin on olemassa sellainen suorakulmio

$$D = \{(x, y) \mid a_1 < x < a_2, b_1 < y < b_2\} \subset \mathbf{R}^2,$$

$(a, b) \in D$, että jokaista $x \in]a_1, a_2[$ kohti yhtälöllä

$$f(x, y) = 0$$

on yksikäsitteinen ratkaisu $y(x) \in]b_1, b_2[$. Funktio $x \mapsto y(x)$ on jatkuvasti derivoituva välillä $]a_1, a_2[$.

Huomaus. Siis funktio $x \mapsto y(x)$ toteuttaa $f(x, y(x)) = 0, \forall x \in]a_1, a_2[$. Katso kuva 1.

Esimerkki Funktion

$$f(x, y) = y^5 + xy - 4 = 0$$

ratkaisupisteet tasossa: Katso kuva 2.

Yhtälön koko ratkaisu ei ole minkään yhden muuttujan funktion kuvaaja!

Lauseen 5.2 (sivu 4) todistus.

Todistus. Oletetaan että $D_2f(a, b) > 0$. Koska D_2f on jatkuva, tästä seuraa että on olemassa $r > 0$ siten, että $D_2f(x, y) > 0$, kun $(x, y) \in B(\bar{\alpha}, r)$ (tässä $\bar{\alpha} := (a, b)$). Tarkastellaan funktioita $y \mapsto f(a, y)$; yllä olevan nojalla se on aidosti kasvava b :n n -ympäristössä. Olkoon $b_1, b_2 \in \mathbf{R}$ sellaisia, että

$$b - \frac{r}{2} < b_1 < b < b_2 < b + \frac{r}{2}.$$

Sisältö:
Väliarvolause
Implisiitti-
funktioilause

Etusivu

◀ ▶


◀ ▶

Sivu 4 / 10

Takaisin

Koko näyttö

Lopeta



Kuva 1: Suorakulmio D

Sisältö:
Väliarvolause
Implisiitti-
funktioilause

Etusivu

◀ ▶


◀ ▶

Sivu 5 / 10

Takaisin

Koko näyttö

Lopeta



Kuva 2: Ratkaisupisteet

Sisältö:
Väliarvolause
Impliitti-
funktiolause

Etusivu

◀▶

◀▶

Sivu 6 / 10

Takaisin

Koko näyttö

Lopeta

Tällöin

$$f(a, b_1) < 0 = f(a, b) < f(a, b_2).$$

Koska f jatkuva, niin on olemassa sellaiset luvut a_1, a_2 ,

$$a - \frac{r}{2} < a_1 < a < a_2 < a + \frac{r}{2},$$

että

$$f(x, b_1) < 0, \quad f(x, b_2) > 0,$$

kun $a_1 < x < a_2$. Olkoon $x \in]a_1, a_2[$. Nyt pätee

$$1^\circ f(x, b_1) < 0, f(x, b_2) > 0$$

$$2^\circ \varphi : y \mapsto f(x, y) \text{ on jatkuva välillä }]b_1, b_2[$$

$$3^\circ \varphi : y \mapsto f(x, y) \text{ on aidosti kasvava.}$$

Tästä seuraa, että on olemassa $y = y(x) \in]b_1, b_2[$, jolle $\varphi(y(x)) = 0$ eli $f(x, y(x)) = 0$. Todistus sille, että $y(x)$ on derivoituva, sivuutetaan. \square

Olkoon $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $A \subset \circ \mathbf{R}^2$, $f(a, b) = 0$ ja $D_2 f(a, b) \neq 0$. Implisiittifunktiolauseesta siis seuraa, että yhtälöllä $f(x, y) = 0$ on yksikäsitteinen ratkaisu $y(x)$ jokaisesta $x \in]a_1, a_2[$ kohti. Funktio $x \mapsto y(x)$ on jatkuvasti derivoituva. Derivaatan $y'(x)$ laskeminen:

Pätee $f(x, y(x)) = 0$, joten

$$0 = \frac{d}{dx} f(x, y(x)) = D_1 f(x, y(x)) \cdot 1 + (D_2 f)(x, y(x)) \cdot y'(x)$$

Sisältö:
Väliarvolause
Implisiitti-
funktiolause

Etusivu



Sivu 7 / 10

Takaisin

Koko näyttö

Lopeta

mistä seuraa

$$y'(x) = \frac{-D_1f(a, b)}{D_2f(a, b)}.$$

Esimerkki Tarkastellaan yhtälöä

$$xy - \sin(x + y) = 0 \quad (2)$$

Tällä on ratkaisu $x = y = 0$. Osoitetaan, että kyseessä oleva yhtälö määrittelee y :n x :n funktiona jossakin pisteen nolla ympäristössä ja lasketaan $y'(0)$.

Ratkaisu. Pätee $f(0, 0) = 0$ (Lause 5.2 (sivu 4) kun $a = 0, b = 0$) ja $D_2f(x, y) = x - \cos(x + y)$, $D_2f(0, 0) = -1 \neq 0$. Lause 5.2 (sivu 4) soveltuu, joten yhtälö (2) määrittelee y :n x :n funktiona.

$$y'(0) = \frac{D_1f(0, 0)}{D_2f(0, 0)} = \frac{-1}{1} = -1.$$

ja

$$D_1f = y - \cos(x + y).$$

Tapaus, jossa implisiittilause EI toimi:

Tarkastellaan yhtälöä

$$\left(\frac{x}{2}\right)^2 + y^2 - 9 = 0 \quad (3)$$

pisteessä $(x, y) = (6, 0)$. Nyt

$$D_2f(x, y) = 2y, \quad D_2f(6, 0) = 0,$$

Sisältö:
Väliarvolause
Implisiitti-
funktioilause

Etusivu

◀◀ ▶▶


◀ ▶

Sivu 8 / 10

Takaisin

Koko näyttö

Lopeta



Kuva 3: Ellipsi

joten implisiittifunktiolauseen oletukset eivät ole voimassa.

Huomatus! Yhtälön (3) ratkaisupisteet muodostavat ellipsin tasoon. Katso kuva 3. Eli y ei ole yksikäsitteinen x :n funktio.

Lause 5.3 Olkoon $A \subset \mathbb{R}^{n+1}$ ja $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ jatkuvasti derivoituva funktio, jolle

Sisältö:
 Väliarvolause
 Implisiitti-
 funktiolause

Etusivu

◀ ▶

◀ ▶

Sivu 9 / 10

Takaisin

Koko näyttö

Lopeta

pisteessä $(\bar{a}, b) \in A \subset \mathbf{R}^{n+1}$

$$f(\bar{a}, b) = 0, \quad D_{n+1}f(\bar{a}, b) \neq 0.$$

Tällöin on olemassa \bar{a} :n ympäristö $B(\bar{a}, r) \subset \mathbf{R}^n$ ja avoin väli $]b_1, b_2[\ni b$ siten, että jokaisella $\bar{x} \in B(\bar{a}, r)$ yhtälöllä $f(\bar{x}, y) = 0$ on yksikäsitteinen ratkaisu $y(\bar{x}) \in]b_1, b_2[$.

Derivaatoille pätee:

$$D_i y(\bar{x}) = -\frac{D_i f(\bar{x}, y(\bar{x}))}{D_{n+1} f(\bar{x}, y(\bar{x}))} \quad i = 1, \dots, n.$$

Lausetta 5.3 (sivu 9) voidaan käyttää, kun halutaan varmistaa, että yhtälön $f(x, y, z) = 0$ ratkaisut muodostavat pinnan \mathbf{R}^3 :ssa (vertaa luku 4).

Esimerkki Yhtälö

$$f(x, y, z) = ze^{x^2+y^2+z^2} = 0$$

määrittelee z :n muuttujien x ja y funktiona eräässä $(0, 0, 0)$:n ympäristössä, sillä

$$f(0, 0, 0) = 0 \cdot e^0 = 0,$$

eli yhtälö toteutuu. Nyt

$$\begin{aligned} D_3 f(x, y, z) &= e^{x^2+y^2+z^2} + z \cdot 2ze^{x^2+y^2+z^2} \\ D_3 f(0, 0, 0) &= 1 \neq 0 \\ D_1 f(x, y, z) &= 2xz e^{x^2+y^2+z^2}. \end{aligned}$$

Siis voidaan ratkaista $z = z(x, y)$, kun (x, y) on pisteen $(0, 0)$ jossain ympäristössä. Derivaatalle saadaan

$$\frac{\partial z}{\partial x}(0, 0) = D_1 z(0, 0) = -\frac{D_1 f(0, 0, 0)}{D_3 f(0, 0, 0)} = -\frac{0}{1} = 0.$$

Sisältö:
Väliarvolause
Implisiitti-
funktioilause

Etusivu

◀ ▶

◀ ▶

Sivu 10 / 10

Takaisin

Koko näyttö

Lopeta